


<b>Impianto di proprietà di</b>				<b>Dompé farmaceutici S.p.A. - Via San Martino, 12 - 20122 Milan, Italy</b>	
<b>Prodotto: NOREMIFA 0-12 - ITALIA</b>					
<b>SPECIFICA RIFERIMENTO:</b>		<b>Materiale:</b> <b>Leaflet</b>	<b>Codice:</b> <b>000000</b>	<b>Codice superato:</b> <b>000000</b>	<b>Codice Dompé:</b> <b>CL57904</b>
<b>Dimensioni:</b> 150 x 200 mm		<b>Fustella</b>	<b>Euro laser</b>		<b>Codice Dompé superato:</b> <b>CL57903</b>
<b>Colori n°:</b>	<b>Pant. Reflex Blu U</b>				<b>Apri nota digitale se presente</b>
<b>1</b>					<b>CODICE LAETUS</b>
<b>Modifica rispetto la versione precedente:</b> Trasferimento titolarità da DP a DF					
<b>Quality Assurance</b> Packaging Development, Italy		<b>Data Emissione</b>	<b>Data Obsolescenza</b>	<b>Archiviare almeno fino a:</b>	<b>Status</b>

**I colori su questa prova sono approssimativi**, questa è una stampa a 600 dpi ottenuta con colori a base acqua CMYK. Definizione e colori non riflettono il risultato finale della produzione stampata.

FRONTE - Font size heading c.39 - Font size subheading c.11,5 - Font size main text c.9 - Font size line-spacing c.11



**Noremifa**<sup>®</sup>  
**SCIROPPO PEDIATRICO 0-12**  
**ANTIREFLUSSO**

#### Indicazioni

Dispositivo medico destinato ad esercitare un'azione meccanica per il trattamento del reflusso gastroesofageo e faringolaringeo nei neonati e nei bambini, al fine di ridurre i sintomi ad esso correlati quali ad esempio: rigurgiti, tosse, pirosi (bruciore di stomaco), infiammazione rinofaringea, disfonia (alterazione della voce) e in tutti i casi di disturbi che abbiano come causa principale o concausa il reflusso gastroesofageo e faringolaringeo. Riduce il tempo di permanenza del contenuto gastrico nello stomaco.

Uso orale.

#### Composizione

Magnesio alginato, Simecicone, Fruttosio, Gomma Xanthan, D-pantenolo, Sodio bicarbonato, Sodio idrossido, p-Ossibenzoato di Metile, p-Ossibenzoato di Propile, Aromi naturali, Acqua depurata.

**Senza glutine, senza lattosio**

#### Confezione

Flacone da 200 ml. Contiene cucchiaino dosatore.

#### Modalità d'uso

Agitare energicamente prima dell'uso.

**Neonati fino a 5 kg di peso:** 2,5-3 ml, 5-10 minuti dopo la poppata o secondo diverso consiglio medico. In caso di rigurgito dopo la somministrazione, somministrare 1 ml aggiuntivo.

**Bambini fino a 3 anni di età:** 5 ml dopo i pasti ed al momento di coricarsi o secondo diverso consiglio medico.

**Bambini fino a 12 anni:** 10-20 ml dopo i pasti ed al momento di coricarsi o secondo diverso consiglio medico.

#### Avvertenze

- Non utilizzare in caso di ipersensibilità nota verso i componenti del prodotto.
- Non superare le dosi consigliate, attenersi alle modalità d'uso.
- In caso di reazioni avverse interrompere il trattamento e consultare il medico.
- È preferibile utilizzare il prodotto dopo eventuale assunzione di farmaci o di altri prodotti.
- Per eventuale assunzione in gravidanza o durante il periodo di allattamento consultare il medico.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare a temperatura ambiente ben chiuso e lontano da fonti di calore.
- Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro e correttamente conservato.
- Il prodotto può presentarsi più o meno viscoso e/o con modeste variazioni di colore, senza alcuno scadimento della qualità del medesimo.
- Si raccomanda di richiudere bene il flacone dopo l'uso.

Rev. 06/2016

#### Dompé farmaceutici S.p.A.

Via San Martino, 12  
 20122 Milano

 **DMG Italia Srl**  
 Via Laurentina, Km 26,700  
 00071 Pomezia (Roma)



CL57904